

# くすりのしおり

内服剤

2022年04月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

## 製品名：サイバインコ錠 50mg

主成分：アブロシチニブ (Abrocitinib)

剤形：淡紅色の楕円形の錠剤、長径 10.5mm、短径 4.8mm、厚さ 3.7mm

シート記載など：CIBINQO、50mg、サイバインコ錠、サイバインコ、PFE ABR 50



## この薬の作用と効果について

ヤヌスキナーゼ（JAK）という酵素を阻害することで、アトピー性皮膚炎に関与するとされる複数のサイトカインの働きを抑制することにより、炎症やかゆみを改善します。

通常、既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎の治療に用いられます。ただし、病気を完治させるものではありません。

## 次のような方は注意が必要な場合があります。必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。感染症（敗血症など）、活動性結核、肝機能障害、好中球減少、リンパ球減少、ヘモグロビン値減少、血小板減少がある。B型肝炎またはその既往、静脈血栓塞栓症のリスク、間質性肺炎の既往歴、腸管憩室、腎機能障害がある。
- ・妊娠、妊娠している可能性がある、授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

## 用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
- ・通常、成人および12歳以上の小児は、1回2錠（主成分として100mg）を1日1回服用します。状態に応じて1回4錠（200mg）を1日1回服用します。中等度および重度の腎機能障害がある場合には、1回1錠（50mg）を1日1回服用します。中等度の腎機能障害がある場合には、状態に応じて1回2錠（100mg）を1日1回服用します。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・飲み忘れた場合は、気がついた時に1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が12時間以内の場合は1回とばして、次の飲む時間に1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、飲むのを止めないでください。

## 生活上の注意

- ・感染症にかかりやすくなる場合があります。人ごみを避け、外出後は手洗いやうがいをするなど、感染症予防対策を心がけてください。
- ・この薬を使用している間は、定期的に胸部X線検査、白血球などの血球数や脂質などに異常がないかを確認するための検査を受けてください。
- ・この薬を使用している間も、保湿外用剤などを継続使用してください。
- ・妊娠可能な女性は、この薬を使用している間および使用終了後一定期間は適切な避妊をするようにしてください。

## この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、吐き気、浮動性めまい、頭痛、上咽頭炎、ざ瘡、毛包炎などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・かぜのような症状、体がだるい、小水疱が帯状に生じる発疹 [感染症]
- ・局所の痛み、紅斑、浮腫 [静脈血栓塞栓症]
- ・鼻血、歯ぐきの出血、体がだるい、頭痛、発熱、のどの痛み [血小板減少、ヘモグロビン減少、リンパ球減少、好中球減少]
- ・発熱、から咳、呼吸困難 [間質性肺炎]
- ・全身けん怠感、食欲不振、吐き気 [肝機能障害]
- ・吐き気、嘔吐、激しい腹痛 [消化管穿孔]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

## 保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄には注意が必要なため受け取った薬局や医療機関に相談してください。他の人に渡さないでください。

・この薬の使用直前および使用中は、生ワクチン〔麻疹（はしか）、風疹（ふうしん）、おたふくかぜ、水痘（みずぼうそう）、BCG、ポリオ（小児まひ）など〕の接種はできません。接種の必要がある場合には医師に相談してください。

**医療担当者記入欄**

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイド」、医療関係者向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。