

# くすりのしおり

内服剤

2021年12月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

## 商品名：インライタ錠 5mg

主成分：アキシチニブ (Axitinib)

剤形：赤色の錠剤、長径 7.7mm、厚さ 3.8mm

シート記載：(表) インライタ 5mg、Pfizer 5XNB、(裏) インライタ 5、Inlyta



## この薬の作用と効果について

血管内皮増殖因子受容体 (VEGFR-1、-2 および -3) を選択的に阻害することにより、血管の新生を阻害し、腫瘍の増殖および転移を抑制して抗腫瘍効果を示します。

通常、根治切除不能または転移性の腎細胞癌の治療に用いられます。

## 次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- ・妊娠または授乳中、妊娠している可能性がある。
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

## 用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
- ・通常、成人は1回1錠（主成分として5mg）を1日2回服用します。状態により適宜増減されることがありますが、1回2錠（10mg）1日2回を超えません。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・飲み忘れた場合は、次の予定服用時刻の3時間前までに服用するか、忘れた分を飲まないで、次の飲む時間に1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

## 生活上の注意

- ・セイヨウオトギリソウ（セント・ジョーンズ・ワート）を含む食品は、この薬の作用を弱めることがありますので、避けてください。
- ・グレープフルーツジュースは、この薬の作用を強めることがありますので、避けてください。

## この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、下痢、高血圧、疲労、手足症候群（手のひらや足底の痛み、赤く腫れあがる、皮膚がむける、水疱など）、発声障害、吐き気、食欲減退、甲状腺機能低下症（寒がり、顔全体のむくみ、けん怠感、動作やししゃべり方が遅いなど）、口内炎、発疹、粘膜の炎症、体重減少、嘔吐、無力症、味覚異常、かゆみ、関節痛、頭痛などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・頭痛、めまい、急激な血圧の上昇 [高血圧、高血圧クリーゼ]
- ・発汗減少、徐脈、皮膚乾燥、発汗、頻脈 [甲状腺機能障害]
- ・鼻血、血尿、便が黒くなる [出血]
- ・激しい腹痛、下血、吐血 [消化管穿孔、瘻孔形成]
- ・全身けん怠感、食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる [肝機能障害]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

## 保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄については受け取った薬局や医療機関に相談してください。

## 医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイド」、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。