

くすりのしおり

内服剤

2021年01月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：ワントラム錠 100mg

主成分：トラマドール塩酸塩(Tramadol hydrochloride)

剤形：白色～灰白色の錠剤、直径9.7mm、厚さ5.2mm

シート記載：ワントラム錠100mg、134、100、Onetram Tab.100mg



この薬の作用と効果について

オピオイド受容体への結合、モノアミン再取り込み阻害作用により強い痛みを抑える働きがあります。通常、非オピオイド鎮痛剤で治療困難ながん疼痛、慢性疼痛の治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。アルコール、睡眠剤、鎮痛剤、オピオイド鎮痛剤または向精神薬による急性中毒である。治療により十分な管理がされていないてんかん、腎障害または肝障害がある。過去2週間以内に他の薬を使った。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
- ・通常、成人は1回1～3錠（主成分として100～300mg）を1日1回服用します。症状により適宜増減されますが、最高量は1日4錠（400mg）とします。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・この薬は徐放性製剤なので、がん疼痛で痛みが突然強くなった場合の臨時追加としては服用できません。臨時追加が必要な場合はトラマドール塩酸塩即放性製剤を服用します。
- ・この薬は徐放性製剤なので、割ったり、砕いたり、かみ砕いたりせずにそのまま服用してください。
- ・飲み忘れた場合は気がついた時にできるだけ早く飲んでください。ただし、次の通常飲む時間が近い場合は、忘れた分は飲まないで1回分を飛ばしてください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

- ・眠気、めまい、意識消失が起こることがあります。また意識消失により自動車事故に至った例もありますので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作は避けてください。
- ・飲酒により薬の作用や副作用が強まることがありますので、服用中の飲酒はひかえてください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、便秘、吐き気、嘔吐、傾眠、浮動性めまい、口渇、食欲減退などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・呼吸困難、喘鳴（ヒューヒュー音）、眼や口唇のまわりのはれ〔ショック、アナフィラキシー〕
- ・呼吸が浅く速くなる、呼吸をしにくい、息苦しい〔呼吸抑制〕
- ・筋肉が発作的に収縮する〔けいれん〕
- ・服用を中止しようとしても止められない、不眠、不安〔依存性〕
- ・意識がなくなる〔意識消失〕

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄については受け取った薬局や医療機関に相談してください。

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイド」、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。