

くすりのしおり

内服剤

2022年09月改訂


薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

製品名：ビビアント錠 20mg

主成分：バゼドキシフェン酢酸塩 (Bazedoxifene acetate)

剤形：淡黄色の錠剤、長径 11.1mm、短径 6.1mm、厚さ 5.0mm

シート記載など：Viviant 20mg、ビビアント 20mg、WY20、骨粗しょう症の薬（1日1回）



この薬の作用と効果について

閉経後に女性ホルモン（エストロゲン）の分泌が低下したことによってバランスを崩した骨の代謝を正常に近づけます。その結果、骨量の低下を改善し、骨折の危険性を減らします。

通常、閉経後骨粗鬆症の治療に用いられます。

次のような方は注意が必要な場合があります。必ず担当の医師や薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。静脈血栓塞栓症またはその既往歴、抗リン脂質抗体症候群、高トリグリセリド血症の既往、腎機能障害、肝機能障害がある。手術の後や長期に安静が必要など、長期間寝たきりまたはそれに近い状態にある。
- ・妊娠、妊娠している可能性がある、授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
- ・通常、1回1錠（バゼドキシフェンとして20mg）を1日1回服用します。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く1回分を飲んでください。ただし、絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、飲むのを止めないでください。

生活上の注意

- ・静脈血栓塞栓症があらわれることがあります。足の痛み・むくみ（片方のふくらはぎが赤くはれる、ふくらはぎを押すと痛むなど）、急に息苦しく感じる、息切れ、胸の痛み、急な視力の低下・文字や形がみえにくい・視野の異常などの症状があらわれた場合には、飲むのをやめ、ただちに医師に相談してください。
- ・静脈血栓塞栓症を起こすおそれが高まるため、手術をした後や長期安静期など、長期間寝たきりまたはそれに近い状態になる場合には、医師と相談の上、薬を飲むのをやめ、完全に歩行できるようになるまで、使用を再開しないでください。また、長時間にわたって飛行機や車に乗る場合など、長期間不動状態となる場合には、前もって医師または薬剤師に相談してください。
- ・カルシウムやビタミンDが不足している人は、医師に相談し、カルシウムやビタミンDを補ってください。
- ・授乳中の方は、この薬を使用している間は授乳を避けてください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、発疹、血管拡張（ほてり）、腹痛、口渇、貧血、線維嚢胞性乳腺疾患（乳腺症、乳腺嚢胞）、筋痙縮（手足の筋肉のつっぱり、下肢痙攣）、関節痛、耳鳴などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・足の痛み・むくみ、突然の呼吸困難・息切れ・胸の痛み、急な視力低下 [静脈血栓塞栓症]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄方法がわからない場合は受け取った薬局や医療機関に相談してください。他の人に渡さないでください。

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイド」、医療関係者向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。