

くすりのしおり

内服剤

2022年02月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：ビブラマイシン錠 50mg

主成分：ドキシサイクリン塩酸塩水和物(Doxycycline hydrochloride hydrate)

剤形：白色の錠剤、直径 6.4mm、厚さ 3.1mm

シート記載：(表) Vibramycin 50mg、50mg、ビブラマイシン、(裏) ビブラマイシン 50mg、ドキシサイクリン塩酸塩、PT 096



この薬の作用と効果について

テトラサイクリン系の抗生物質で、感染症の原因となる色々な細菌の蛋白合成を阻害することにより殺菌作用を示します。

通常、皮膚感染症、呼吸器感染症、耳鼻科感染症など広い範囲の感染症の治療に使用されます。真菌やウイルス性の病気には効果がありません。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。肝機能障害、食道通過障害がある。食事または口から摂取する栄養を十分にとれていない、全身状態が悪い。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
- ・通常、成人は初日に1回4錠〔主成分として200mg（力価）〕を1日1回、または1回2錠〔100mg（力価）〕を1日2回服用し、2日目から1回2錠〔100mg（力価）〕を1日1回服用します。なお、感染症の種類および症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・コップ1杯程度の多めの水で服用し、寝る直前の服用はさけるようにしてください（食道に長く留まってしまうと潰瘍を作ることがあります）。
- ・飲み忘れた場合は、1日以内に気がついた場合であれば、気がついた時点で1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、吐き気・嘔吐、食欲不振、発疹、発熱、じんましん、光線過敏症（光に当たった部分が赤くなる）、多形紅斑（皮膚の赤み）などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・呼吸困難、顔や唇のむくみ・のどの腫れ、全身のほてり〔ショック、アナフィラキシー〕
- ・高熱、皮膚の発疹・水疱・はがれ、眼の充血〔中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、剥脱性皮膚炎〕
- ・発疹、発熱、リンパ節腫脹〔薬剤性過敏症症候群〕
- ・腹痛、頻回の下痢、血便〔偽膜性大腸炎〕
- ・食欲不振、全身けん怠感、皮膚や白目が黄色くなる〔肝炎、肝機能障害、黄疸〕

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。